htd
hrvatsko torakalno društvo

TORAKS 2019

9. Kongres Hrvatskog torakalnog društva
9th Congress of Croatian Thoracic Society

Hotel Westin Zagreb
10.–13. 4. 2019.



UTJECAJ PLUĆNE TUBERKULOZE NA REZULTATE SPIROMETRIJE

ŠKORO M.[1], Škoro B.[2], Popović-Grle S.[1]

[1] Klinika za plućne bolesti Jordanovac, Zagreb, Croatia
Zavod za alergijske i opstruktivne bolesti pluća

[2] Opća županijska bolnica Vinkovci, Vinkovci, Croatia
Odjel interne medicine

Objective: Jednom preboljena tuberkuloza može rezultirati trajnim oštećenjem pluća, parenhima i dišnih puteva te smanjenjem plućne funkcije, ostavljajući za sobom kronične tegobe i smanjenu kvalitetu života. Najčešća dijagnosticirana smetnja plućne funkcije pri kroničnom praćenju takvih bolesnika je opstrukcija dišnih puteva koja se može javiti već i na samom početku bolesti.

Svega par populacijskih istraživanja su pokušala dokazati povezanost povijesti plućne tuberkuloze i opstrukcije dišnih puteva od kojih su najveće PLATINO i BOLD studija. Obje populacijske studije dokazale su povezanost povijesti plućne tuberkuloze s povećanim rizikom za plućnu opstrukciju (PLATINO - OR 4.06 za muškarce i OR 2.34 za žene; BOLD - aOR 2.51 za oba spola) i to neovisno o godinama, spolu, indeksu tjelesne težine, kumulativnoj izloženosti prašini na radnome mjestu, izloženosti duhanskom dimu, izloženosti pasivnom pušenju i razini obrazovanja ispitanika uključenih u studiju.

Također, istraživanja su ukazala i na pozitivnu korelaciju između broja liječenih recidiva tuberkuloze i pada plućne funkcije. Prosječni pad FEV_1 značajno se povećava s brojem epizoda plućne tuberkuloze. Ovakvi podatci ukazuju na nužnost dugotrajnog praćenja pacijenata te sprječavanja recidiva tuberkuloze, kako bi se spriječila daljnja destrukcija plućnog tkiva i progresija pada plućne funkcije.

htd
hrvatsko
torakalno
društvo

TORAKS 2019

9. Kongres Hrvatskog torakalnog društva
9th Congress of Croatian Thoracic Society

Hotel Westin Zagreb
10.-13. 4. 2019.

