htd
hrvatsko torakalno društvo

TORAKS 2019

9. Kongres Hrvatskog torakalnog društva
9th Congress of Croatian Thoracic Society

Hotel Westin Zagreb
10.–13. 4. 2019.



POSTAVLJANJE STENTA KOD SINDROMA GORNJE ŠUPLJE VENE

KARABATIĆ S.[1], RADAKOVIĆ Đ.[1], ZOVKO T.[1], KUKULJ S.[1], JAKOPOVIĆ M.[1]

[1] kbc Zagreb, ZAGREB, Croatia
Zavod za tumore pluća i sredoprsja

Objective: Sindrom gornje šuplje vene nastaje kao rezultat djelomične ili potpune opstrukcije protoka krvi kroz gornju šuplju venu. Najčešće se javlja kao posljedica maligne neoplazme, dominantno neplazme pluća. Znakovi i simptomi uključuju oticanje lica ili vrata i gornjih ekstremiteta, dispneju, ortopneju, kašalj, cijanozu, kolaterale dilatiranih prsnih vena, laringealni otok, povišenje venskog i cerebrospinalnog tlaka. Intenzitet zavisi od obima i brzine nastajanja opstrukcije i općeg stanja pacijenta. Liječenje sindroma gornje šuplje vene ovisi o simptomima, o osnovnoj malignoj bolesti, o očekivanom preživljenju bolesnika. Očekivano preživljenje u bolesnika sa SVC je oko 6 mjeseci kod karcinoma pluća. Preporuka je kemoterapija, radioterapija ili stent za simptomatski SVC kod karcinoma pluća (NCCN i ACCP). Centralna opstrukcija dišnog puta, moždani edem i teški edem larinksa indikacija su za hitno postavljanje endovaskularnog stenta u venu cavu superior. Stentiranje SVC-a je siguran i djelotvoran terapijski postupak ublažavanja simptoma. SVC-a kod pacijenata koji se podvrgavaju primarnom stentiranju prije i onima nakon neuspjeha konvencionalne terapije. Posljednjih godina sve više u praksi se razmatra primarni stenting kao tretman prve linije prije konvencionalne terapije zbog svojih obećavajućih rezultata. Nije bitan tip tumora, ne zahtijeva dodatne analize i ne ometa daljnji konačni tretman bolesnika.
Unazad 2 godine, u liječenju SVC endovaskularni stent postavljen je u 24 bolesnika na Klinci za plućne bolesti Jordanovac. Stentovi su postavljeni transfemoralnim venskim pristupom. Postupak je izveden na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinički bolnički centar Zagreb. Prednost stentiranja SVC je odmah ili ubrzo nakon postavljanja stenta uočljiv učinak u ublažavanju simptoma i znakova.
Medicinske sestre u okviru svojih kompetencija provode niz postupaka u skladu s potrebama bolesnika iz područja zdravstvene njege, dijagnostike, primjene lijekova i pripremi bolesnika za terapijske postupke. Uloga medicinske sestre je u pravovremenom prepoznavanju prisutnih simptoma i znakova SVC, kontinuiranom praćenju stanja pacijenta, prevenciji i tretiranju popratnih pojava i mogućih komplikacija terapijskih tretmana u liječenju SVC.

htd
hrvatsko
torakalno
društvo

TORAKS 2019

9. Kongres Hrvatskog torakalnog društva
9th Congress of Croatian Thoracic Society

Hotel Westin Zagreb
10.-13. 4. 2019.

