



## SPECIFIČNOST ZDRAVSTVENE NJEGE PACIJENATA KOD OPERACIJE JEDNJAKA NAKON KONZUMACIJE KOROZIVNIH SREDSTAVA

FIKET V.<sup>1</sup>, ŠTRUCELJ I.<sup>1</sup>, ŠKVORC M.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> KBC ZAGREB, ZAGREB, Croatia  
*KLINIKA ZA TORAKALNU KIRURGIJU*

### Objective:

**SPECIFIČNOSTI ZDRAVSTVE NJEGE PACIJENATA KOD OPERACIJE JEDNJAKA NAKON KONZUMACIJE KOROZIVNIH SREDSTAVA**



## SAŽETAK:

Konsumacija korozivnih sredstava može prouzrokovati ozbiljne ozljede jednjaka i želuca. Stupanj ozljede određuje se prirodom tvari (stupanj do kojeg može prouzrokovati oštećenje), količinom koja se konzumira ili njegovom koncentracijom i stanjem (kruta ili tekuća) i vremenom kontakta s gastrointestinalom sluznicom. Konzmacija korozivnih sredstava može rezultirati znatnim ozljedama cijelog gastrointestinalnog trakta, ali najznačajnije gornjeg gastrointestinalnog trakta, uključujući orofaringealnu šupljinu, grkljan, jednjak i želudac. Ishodi ozljede ovise o ozbiljnosti lezija, pacijentovom općem stanju i brzini liječenja. Smrtnost kod kompromitiranih pacijenata je značajna, osim toga, teške posljedice prate najteže ozljede. Međutim, komplikacije kao što su nekroza, traheoezofagealna fistula, krvarenje, perforacija, pojaviti u pacijenata tijekom prva dva do tri tjedna nakon konzumacije korozivnog sredstva. Dugotrajne komplikacije uključuju disfagiju i povećani rizik od karcinoma jednjaka koji utječe na kvalitetu života pacijenata. Brza dijagnoza i liječenje od najveće su važnosti u smanjenju smrtnosti i postizanju optimalnih dugoročnih ishoda u slučajevima konzumacije korozivnih sredstava. Liječenje podrazumijeva operativni zahvat uključujući endoskopsku dilataciju, a najčešće ezofagektomiju. Medicinska sestra provodi intervencije prije i nakon operativnog zahvata prevenirajući komplikacije. U postoperativnom razdoblju, pacijent se smješta u jedinicu intenzivnog liječenja uz kontinuirani nadzor vitalnih funkcija.