



KVALITETA ŽIVOTA ODRASLIH BOLESNIKA S CISTIČNOM FIBROZOM TIJEKOM PANDEMIJE COVID-19 U HRVATSKOJ

ODOBASIC PALKOVIC T.¹, Lalić Čičković I.¹, Godić I.², Vukić Dugac A.¹

¹ Klinika za plućne bolesti, KBC Zagreb, Zagreb, Croatia
Centar za cističnu fibrozu djece i odraslih

² Klinika za plućne bolesti Jordanovac, Zagreb, Croatia
KBC Zagreb

Objective:

CILJEVI: Cilj ovog istraživanja je ispitati utjecaj teškog akutnog respiratornog sindroma koronavirus 2 (SARS-CoV-2) na kvalitetu života bolesnika s cističnom fibrozom u Hrvatskoj.

METODE: Istraživanje je provedeno na uzorku od 30 odraslih bolesnika s cističnom fibrozom (CF) starijih od 19 godina (17/30 žena) u tijeku drugog vala pandemije i 26 bolesnika u trećem valu, a liječe se u našem CF centru. Bolesnici su odgovorili na 15 kratkih pitanja u vezi sa subjektivnom percepcijom kvalitete života tijekom drugog i trećeg vala pandemije SARS-CoV-2 u Hrvatskoj.



htd

hrvatsko
torakalno
društvo

Croatian
Thoracic
Society

TORAKS 2021

11. kongres Hrvatskog torakalnog društva
11th Congress of the Croatian Thoracic Society
19.-22. svibnja | May
Virtualni kongres | Virtual congress

REZULTATI: U tijeku drugog vala pandemije, polovina odraslih bolesnika s CF bila je zabrinuta zbog SARS-CoV-2, ali samo je jedan (3,3%) zanemario kontrolni posjet liječniku. 18/30 osoba bilo je manje aktivno. 5/30 (16,7%) imalo je češća pogoršanja bolesti. Jedna četvrtina (26,7%) izgubila je na težini, dok je pola (53,3%) dobilo na težini. U trećem valu na težini gube jednako (26,9%) dok (46,2%) dobiva na težini. U tijeku trećeg vala zabrinutost pada za (10%), dok je broj manje aktivnih jednak. Bilježi se značajan porast u broju testiranih od (47%), a broj pozitivnih kojih u drugom valu nije bilo sada je 4/26 (15,4%). Polovina (13/26) ispitanika se cijepilo protiv Covida-19 i osjeća da im je kvaliteta života značajno narušena tijekom drugog vala pandemije, a u trećem je pala za još (10%).

ZAKLJUČAK: Kvaliteta života odraslih bolesnika s cističnom fibrozom bila je značajno smanjena tijekom pandemije SARS-CoV-2 kod polovine naših bolesnika, a još više je narušena u tijeku trećeg vala kad se bilježi veliki porast testiranja i pojava pozitivnih nalaza. U našoj anketi pokazali smo kako su bolesnici s CF-om bili manje aktivni, a mali broj njih je smršavio. Iako kvalitetu života teško možemo točno izmjeriti, mjerenje i dalje ostaje relevantno. Kod procjene naših bolesnika s CF-om ovakvi alati mogu pružiti važne informacije kao dodatak njihovom zdravstvenom stanju.