



POP RATNE POJAVE KEMOTERAPIJE I IMUNOTERAPIJE

KARABATIĆ S.¹, Šajnić A.¹, Lukić Franolić I.¹, Brkić M.¹

¹ KBC Zagreb, Zagreb, Croatia
Zavoda za tumore pluća i sredoprsja

Objective:

PRIKAZ SLUČAJA

Kemoterapijski agensi koji sadrže platinu (cisplatin, karboplatin, oksaliplatin) odobreni su u prvoj liniji liječenja brojnih malignih bolesti, poput raka jajnika, mokraćnog mjehura, glave i vrata, kolorektalnog karcinoma i raka pluća. Njihova opsežna uporaba tijekom posljednjeg desetljeća dovela je do značajnog porasta incidencije reakcija preosjetljivosti, koje se definiraju kao nepredviđene reakcije čiji se znakovi i simptomi ne mogu objasniti poznatom toksičnošću ovih lijekova. Osip na koži, crvenilo, grčevi u trbuhu, svrbež dlanova i bol u leđima česti su simptomi. Kardiovaskularne i respiratorne komplikacije mogu biti fatalne. Preosjetljivost se obično javlja nakon višestrukih infuzija, što ukazuje na alergijske reakcije tipa I; postoje i druge vrste preosjetljivosti. Na raspolaganju imamo nekoliko opcija upravljanja: prekid kemoterapije, premedikacija, produljenje trajanja infuzije, protokoli desenzibilizacije i zamjena drugim spojem platine nakon provođenja kožnih testova koji isključuju križne reakcije među lijekovima platine. S druge strane primjena imunoterapije ušla je u opsežniju uprabu za liječenje raka pluća i moramo biti spremni na pojavu svih popratnih pojava osobito onih koji su prema kliničkim studijama svrstane u jako rijetke, ali mogu biti smrtonosne. Kroz 4 prikaza slučaja



pacijenata koji su liječeni na klinici Jordanovac prezentirat ćemo kako smo upravljali sa pojedinom nepredviđenom reakcijom preosjetljivosti.