



## POP RATNE POJAVE KEMOTERAPIJE I IMUNOTERAPIJE

KARABATIĆ S.<sup>1</sup>, Šajnić A.<sup>1</sup>, Lukić Franolić I.<sup>1</sup>, Brkić M.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> KBC Zagreb, Zagreb, Croatia  
Zavoda za tumore pluća i sredoprsja

### Objective:

### PRIKAZ SLUČAJA

Kemoterapijski agensi koji sadrže platinu (cisplatin, karboplatin, oksaliplatin) odobreni su u prvoj liniji liječenja brojnih malignih bolesti, poput raka jajnika, mokraćnog mjehura, glave i vrata, kolorektalnog karcinoma i raka pluća. Njihova opsežna uporaba tijekom posljednjeg desetljeća dovela je do značajnog porasta incidencije reakcija preosjetljivosti, koje se definiraju kao nepredviđene reakcije čiji se znakovi i simptomi ne mogu objasniti poznatom toksičnošću ovih lijekova. Osip na koži, crvenilo, grčevi u trbuhu, svrbež dlanova i bol u leđima česti su simptomi. Kardiovaskularne i respiratorne komplikacije mogu biti fatalne. Preosjetljivost se obično javlja nakon višestrukih infuzija, što ukazuje na alergijske reakcije tipa I; postoje i druge vrste preosjetljivosti. Na raspolaganju imamo nekoliko opcija upravljanja: prekid kemoterapije, premedikacija, produljenje trajanja infuzije, protokoli desenzibilizacije i zamjena drugim spojem platine nakon provođenja kožnih testova koji isključuju križne reakcije među lijekovima platine. S druge strane primjena imunoterapije ušla je u opsežniju uprabu za liječenje raka pluća i moramo biti spremni na pojavu svih popratnih pojava osobito onih koji su prema kliničkim studijama svrstane u jako rijetke, ali mogu biti smrtonosne. Kroz 4 prikaza slučaja



pacijenata koji su liječeni na klinici Jordanovac prezentirat ćemo kako smo upravljali sa pojedinom nepredviđenom reakcijom preosjetljivosti.