



## DELIRIJ KOD MALIGNE BOLESTI

RADAKOVIĆ Đ.<sup>1</sup>, Majerić M.<sup>2</sup>, Karabatić S.<sup>3</sup>, Grgec T.<sup>3</sup>, Šajnić A.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> KBC ZAGREB, KPB JORDANOVAC, ZAGREB, Croatia  
ODJEL ZA TUMORE SREDOPRSJA

<sup>2</sup> KBC ZAGREB, KPB JORDANOVAC, ZAGREB, Croatia  
ODJEL ZA TUMORE PLUĆA

<sup>3</sup> KBC ZAGREB, KPB JORDANOVAC, ZAGREB, Croatia  
ZAVOD ZA TUMORE PLUĆA I SREDOPRSJA

### Objective:

Delirij je akutni neuropsihijatrijski poremećaj karakteriziran sa poremećajima svijesti, pažnje ili mišljenja različitih somatskih uzroka, naglog početka i promjenjivog tijeka. Rizik od pojave delirija kod oboljelih od malignih bolesti raste s porastom dobi i težinom bolesti. Alati za procjenu rizika postoje, ali prepoznavanje često izostane ili je prekasno. U istraživačkom članku *"SQiD, the Single Question in Delirium; can a single question help clinicians to detect delirium in hospitalised cancer patients? running heading Single Question in Delirium"* (Sands, Sharma i sur.) objavljenom 2021. godine u *BMC cancer* prikazani su rezultati istraživanja u kojem se kao alat za procjenu rizika koristio SQiD u usporedbi s psihijatrijskim kliničkim intervjuom i Confusion assessment method (CAM), testom koji je najčešće korišten u procjeni delirija. Istraživanje je provedeno u dva klinička centra u Sydneyu, Australija. Zdravstveno osoblje koje je skrbilo za oboljele od malignih bolesti educirano je za primjenu CAM. SQiD je korišten kao dio uobičajene skrbi od strane zdravstvenog osoblja te nije zahtijevalo posebnu edukaciju. Upućeni su da pitanje „Osjećate li da je (ime pacijenta) više zbunjen u posljednje



vrijeme?” postavljene jednoj pacijentovoj najbližoj osobi. Test je jednostavan s odgovorom “da” ili “ne” te dozvoljava i omogućuje sudjelovanje obitelji u diskusiji, a ni pacijent nije isključen. Bilo koja promjena u kognitivnom ili emocionalnom ponašanju ili psihomotornoj aktivnosti može ukazivati na prisutnost delirija, a educirano i iskusno zdravstveno osoblje u procjeni bi trebalo potvrditi dijagnozu delirija dostupnim kliničkim alatima. Rad sugerira korištenje SQiD upitnika zbog jednostavnosti primjene što omogućava lakše i brže prepoznavanja delirija.

Ključne riječi: delirij, maligna bolest, procjena rizika