



BRONHOALVEOLARNA LAVAŽA U OPĆOJ ANESTEZIJI

TRUPKOVIĆ A.¹, Vuger K.¹, Vajić S.¹

¹ Klinika za plućne bolesti - KBC Zagreb, Zagreb, Croatia
Odjel za bronhoskopiju i interventnu pulmologiju

Objective:

Bronhoalveolarna lavaža (BAL) u općoj anesteziji je terapijska bronhoskopska tehnika. Omogućava analizu perifernih dijelova plućnog parenhima i dobivanje staničnih i nestaničnih komponenata iz perifernog, bronhoalveolarnog dijela respiratornog sustava. BAL se izvodi u dijagnostici infekcija parenhima, naročito u imunokompromitiranih bolesnika, malignih bolesti, intersticijskih plućnih bolesti. Kao terapijska metoda BAL u općoj anesteziji se izvodi kod bolesnika s alveolarnom proteinozom.

Izvođenje BAL-a kao terapijskog bronhoskopskog postupka sudjeluje multidisciplinarni tim liječnik bronhoskopičar, medicinske sestre, anesteziolog, anesteziološki tehničar. Priprema bolesnika, sterilnog višekratnog potrošnog materijala, operacijske sale počinje dan ranije. Prosječno trajanje bronhoalveolarne laveže je 6 sati uz pripremu bolesnika te pripremu instrumenta, 20l zagrijane fiziološke otopine za ispiranje jednog plućnog kila. Bolesnici se obavezno opserviraju u intenzivnoj njezi.



Ključ uspjeha leži u dobroj pripremi bolesnika prije, tijekom i nakon postupka te komunikaciji unutar multidisciplinarnog tima.