



ULOGA MEDICINSKE SESTRE KOD PRIMJENE FIBRINOLITIČKE TERAPIJE I PLEURODEZE

DIVALD V.¹

¹ KBC ZAGREB, Zagreb, Croatia
Torakalna kirurgija

Objective:

Primarno liječenje pleuralnog izljeva odnosi se na postavljanje drenažnog sustava u pleuralnu šupljinu. Ponekad pleuralni izljev može biti septiran što onemogućava njegovu evakuaciju putem torakalnog drena. Primjena fibrinolitičke terapije omogućava liječenje i ovakvih složenih izljeva, a pleurodeza prevenira ponovno nakupljanje tekućine. Skrb za bolesnika s ovom problematikom je specifična i složena te zahtijeva potpuni sestrinski angažman i pažnju.

Prikaz slučaja:

- Bolesnica stara 42 godine, prezentirala se sa opsežnim malignim ljevostranim izljevom, kao posljedica karcinoma lijeve dojke. Pod kontrolom UZV-a, učinjena je torakalna drenaža sa 2



pleurokana, sa djelomičnom evakuacijom pleuralnog izljeva. Zatim je uslijedila primjena fibrinolitičke terapije lijekom "Alteplaza" kroz drenažni sustav. Tijekom boravka na odjelu pacijentici su redovno kontrolirani laboratorijski nalazi I vitalni parametri, nadziran je drenažni sustav I drenažni sadržaj.

Nakon par dana bolesnici su odstranjeni pleurokani I otpuštena je na kućno liječenje