



PRISUSTVO ANKSIOZNOSTI I RANIH ZNAKOVA DEPRESIVNOSTI KOD PACIJENTKINJA SA KARCINOM DOJKE LIJEČENE U KLINIČKOM CENTRU CRNE GORE

BRANDMAJER T.^{1,2}, Saveljic M.^{1,2}, Karabatic S.³

¹ Klinički centar Crne Gore, Podgorica, Crna Gora, Podgorica, Montenegro
Klinički centar Crne Gore, Podgorica, Crna Gora

² Medicinski fakultet, Univerziteta Crne Gore, Podgorica, Crna Gora, Podgorica, Montenegro
Medicinski fakultet, Univerziteta Crne Gore, Podgorica, Crna Gora

³ Klinika za plućne bolesti Jordanovac, KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska, Zagreb, Croatia
Klinika za plućne bolesti Jordanovac, KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Objective:

Karcinom je jedan od najčešćih karcinoma kod žena. Tretman se smatra traumatičnim iskustvom za žene i može dovesti do psiholoških reakcija kao što su poricanje, ljutnja ili intenzivan strah od svoje bolesti i samog tretmana. Takođe mnoge pacijentkinje sa ovom bolešću pate od depresije i anksioznosti.

Svrha ove studije bila je procijeniti prevalenciju i povezane faktore depresije i anksioznosti kod pacijenata sa karcinomom dojke liječene u Kliničkom centru Crne Gore



Methods:

Istraživanjem je obuhvaćeno 88 pacijentkinja koje su se pratila u onkološkoj ambulanti. Podaci su prikupljeni strukturiranim upitnikom koji se sastojao od društvenih, kliničkih i demografskih informacija kao i PHQ-9 i GAD-7 skale.

Result:

Prosječna starost pacijenata bila je 53,25 godina (SD=12,10), 69,7% pacijenata je podvrgnuto mastektomiji, a 30,3% onektomiji. Hemoterapiju je primilo 46,1% pacijenata kao pomoćnu terapiju, 15,8% radioterapiju, a 38,2% je primalo i hemoterapiju i radioterapiju. Rezultati na PHQ-9 skali za procjenu depresivnosti pokazali su da je 15,4 % ispitanika ispunilo kriterijume za dijagnozu "teske depresije" (20-25 PHQ skor), 20,05% za dijagnozu "umjerene depresije" (15-19 PHQ skor), a čak 31% svih pacijentkinja obuhvaćeno istraživanjem su ispunile kriterijuma za dijagnozu "blage i umjerene depresije" (PHQ skor 5-14). Takođe rezultati na GAD-7 skali su pokazali visok stepen anksioznosti kod 46.25% ispitanica (14-20 Gad-7 skor).

Conclusion:

Pacijenti s karcinomom dojke su u visokom riziku za razvoj psihijatrijskih poremećaja kao što su depresija i anksioznost.

Ključne riječi: psihološki distres; depresija; anksioznost; karcinom dojke.

TORAKS 2024

14. kongres Hrvatskog torakalnog društva
14th Congress of the Croatian Thoracic Society

HOTEL HILTON GARDEN INN, ZAGREB
22. – 25. 5. 2024.

htd

hrvatsko
torakalno
društvo

Croatian
Thoracic
Society