

TORAKS 2018

8. Kongres Hrvatskog
torakalnog društva

8th Congress of Croatian
Thoracic Society

18.–21. travanj | april
Hotel Westin Zagreb



SMJERNICE ZA SIGURNO POSTAVLJANJE PERIFERNOG VENSKOG PUTA

KARABATIĆ S.¹, Šajnić A.¹, Majerić M.¹, Grgec T.¹, Radaković Đ.¹, Sokač V.¹, Mareković I.²

¹ KBC Zagreb, Zagreb, Croatia
Klinika za plućne bolesti "Jordanovac"

² KBC Zagreb, Zagreb, Croatia
Klinički zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju

Objective: UVOD: Prema smjernicama WHO dezinfekcija mjesta insercije: čišćenje mjesta čvrstim ali laganim pritiskom s 70% alkoholnom blazinicom – trajanje 30 sekundi, započinjemo od središta insercije potezom od gornje strane prema doljnoj vanjskoj strani, pokrivajući površinu od 2cm ili više, a zatim čekamo potpunog sušenja 30 sekundi.[1] U slučaj vidno nečiste površine kože potrebno je pranje vodom i sapunom a zatim sušenje jednokratnim papirnatim ručnicima.[1] Kod svih primjena injekcija preporuka je pranje kože osim kod venepunkcije.[2]

PRIKAZ SLUČAJA: Kako odabrati venu i odgovarajuću i.v. kanilu, ponoviti smjernice za kontrolu infekcija, pravilno dokumentirati svako postavljanje i.v. kanile, naučiti kritički razmišljati, upravljati rizicima i komplikacijama i.v. kanila.

ZAKLJUČAK: Prednost treba dati venama koje su dostupne, nekorištene, koje su palpabilne. Takve vene su na dodir mekane i napune se brzo nakon kompresije (Weinstein, 2007). Duge, ravne vene sa velikim lumenom su idealne (Dougherty i Lister, 2011). Međutim, postoje mnogi bolesnici koji nemaju „idealne“ vene i praktičari se moraju oslanjati na svoje znanje o anatomiji i iskustvu kako bi se utvrdilo najbolje mjesto za postavljanje kanile u takvim situacijama. Najčešći korišteni su vena bazilika ili vena cefalika podlaktice, koji omogućuju postavljanje različitih veličina kanile lako ih je imobilizirati i ne uzrokuje previše ograničenja u aktivnostima bolesnika. Kad god je moguće dominantnu ruku treba izbjegavati. Ne smije biti više od 2 neuspješna pokušaja. Provjeriti

TORAKS 2018

8. Kongres Hrvatskog
torakalnog društva

8th Congress of Croatian
Thoracic Society

18.–21. travanj | april
Hotel Westin Zagreb



kontraindikacije za postavljanje kanile. Informirati pacijenta o postupku i dobiti suglasnosti. Informirati pacijenta o mogućim komplikacijama

Literatura:

1.WHO guidelines on drawing blood: best practices in phlebotomy.

Dostupno:http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44294/9789241599221_eng.pdf;jsessionid=314C4737F97A693C7ECF1777EB4BE8FC?sequence=1.

2.WHO best practices for injections and related procedures toolkit. Dostupno:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK138491/pdf/Bookshelf_NBK138491.pdf.